

Mictie cystografie Röntgenonderzoek van de blaas

Inleiding

In overleg met uw behandelend uroloog hebt u besloten een röntgenonderzoek van de blaas en urinewegen te laten verrichten. In deze folder wordt in grote lijnen de gang van zaken rond het onderzoek beschreven. Een verpleegkundige en een radiodiagnostisch laborant voeren het onderzoek uit.

Mictie cystografie

Bij een mictie cystografie wordt met behulp van röntgenstraling en een van tevoren toegediende contrastvloeistof de werking van de blaas en urinewegen voor, tijdens en na het plassen vastgelegd op foto's.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Indien dit onderzoek wordt uitgevoerd bij een baby, wordt de ouders aangeraden een fles met voeding mee te nemen.

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent. Indien dit het geval is, neem dan contact op met de aanvragend arts. Deze overlegt met u of het onderzoek moet doorgaan.

Plaats en duur

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek urologie (nr 44) en duurt ongeveer 45 minuten.

Het onderzoek

Voor het onderzoek vragen wij u het onderlichaam van kleding te ontdoen. Vervolgens neemt u plaats op de onderzoektafel. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met gespreide benen, waarbij uw knieholtes in steunen rusten.

De verpleegkundige maakt de plasbuisopening en omgeving schoon met een watje met water. Daarna wordt de plasbuis plaatselijk verdoofd door middel van een speciaal glijmiddel. Vervolgens brengt de verpleegkundige een slangetje via de plasbuis in de blaas. De urine die nog in de blaas zit wordt op deze wijze verwijderd en voor onderzoek opgestuurd.

Er wordt nu een foto gemaakt van de buik met een lege blaas. Hierna wordt middels het slangetje in uw blaas de blaas gevuld met een contrastvloeistof. Als de blaas goed is gevuld wordt er opnieuw een foto van de buik gemaakt, nu van een volle blaas.

Vervolgens worden er nog foto's gemaakt terwijl u uitplast en als u klaar bent met plassen.

Nazorg

Meteen na het onderzoek krijgt u een handdoek en een washandje waarmee u zich kunt opfrissen. Het is aan te raden de rest van de dag extra veel te drinken om een blaasontsteking te voorkomen.

Risico's

In een uiterst zeldzaam geval kan het voorkomen dat u overgevoelig bent voor de contrastvloeistof. Bent u overgevoelig voor contrastvloeistof, meld dit van tevoren aan de arts.

Indien u zich tijdens het onderzoek niet goed voelt, moet u dit meteen zeggen. Te denken valt aan duizeligheid, misselijkheid, transpireren.

Daarnaast bestaat er een kleine kans dat u een blaasontsteking krijgt als gevolg van dit onderzoek.

**Uitslag**

U krijgt meestal aansluitend aan het onderzoek de uitslag van uw behandelend uroloog.

Tenslotte

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de verpleegkundige van de afdeling urologie, bereikbaar via telefoonnummer: (0475) 38 22 41.