

Informatiebrief over MS en Coronavirus (COVID-19)

Het is niet bekend welk effect het Coronavirus op mensen met MS heeft. Door het gebruik van MS remmende medicatie kunnen de verschijnselen van een Coronavirus infectie mogelijk ernstiger verlopen dan bij mensen zonder MS. Het voorkomen van een besmetting is daarom de eerste prioriteit.

Ter voorkoming van infectie adviseren we de richtlijn van het RIVM te volgen:

- Vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen
- Ga niet naar evenementen en overweeg of je echt naar een feestje of bijeenkomst moet gaan.
- Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer.
- Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn.

- Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
 - Handen regelmatig wassen met water en zeep
 - Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 - Gebruik papieren zakdoekjes
 - Geen handen schudden
 - Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft

Met betrekking tot MS remmende medicatie volgt de afdeling Neurologie van het Laurentius Ziekenhuis het advies van de MS Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Internationale MS federatie:

In geval van GEEN symptomen van een Coronavirus infectie:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • Interferon-beta (Avonex/Betaferon/Rebif/Plegridy): | doorgaan met gebruik |
| • Glatirameer-acetaat (Copaxone): | doorgaan met gebruik |
| • Teriflunomide (Aubagio): | doorgaan met gebruik |
| • Dimethylfumaraat (Tecfidera): | doorgaan met gebruik |
| • Fingolimod (Gilenya): | doorgaan met gebruik |
| • Natalizumab (Tysabri): | doorgaan met gebruik |
| • Ocrelizumab (Ocrevus): | in overleg met de Neuroloog |
| • Cladribine (Mavenclad): | in overleg met de Neuroloog |
| • Alemtuzumab (Lemtrada): | in overleg met de Neuroloog |

In geval van WEL symptomen van een Coronavirus infectie is het advies altijd met uw Neuroloog te overleggen ongeacht welke MS remmende medicatie u gebruikt.

Bovenstaande informatie kan wijzigen ten gevolge van nieuwe informatie en nieuwe inzichten.