

## Informatie over Coronavirus (COVID-19) en het gebruik van medicatie voor de behandeling van huidziekten.

Slikt u voor de behandeling van uw huidziekte een medicijn dat het immuunsysteem beïnvloedt? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Het gaat om de medicijnen in de onderstaande tabel. Lees goed na of u een van deze medicijnen slikt of spuit.

Stofnaam	Merksnaam
ciclosporine	Neoral, Ciqorin, Sandimmune
methotrexaat	Metoject, Ebetrex , Emthexate, Injexate
azathioprine	Imuran, Azafalk
mycofenolaatmofetil	Cellcept, Myfenax
Dimethylfumaarzuur	Skilarence, Psorinovo
adalimumab	Humira, Hyrimoz, Amgevita
etanercept	Enbrel, Benepali, Erelzi
ustekinumab	Stelara
secukinumab	Cosentyx
ixekizumab	Taltz
risankizumab	Skyrizi
Infliximab	Remicade, Zessly
brodalumab	Kyntheum
omalizumab	Xolair

De adviezen die we hieronder geven zijn in lijn met die van de Nederlandse vereniging van dermatologen (NVDV).

**U heeft geen verschijnselen van een Corona-infectie (geen koorts, geen hoest, geen keelpijn, geen neusverkoudheid).**

Zolang u geen verschijnselen heeft van een Corona infectie is er vanuit de Nederlandse vereniging van dermatologen geen dringend medisch advies om met deze medicijnen te stoppen.

Maar, de WHO (World Health Organisation) en het RIVM beschouwen mensen die immuunmedicatie gebruiken (zie de tabel) als een risicogroep die een grotere kans heeft om een ernstige Corona infectie te krijgen. Op dit moment is er echter nog onbekend hoeveel groter die kans is.

Het is goed om te beseffen dat nadat u bent gestopt met de medicatie, de werking ervan nog enige tijd kan aanhouden (weken tot maanden), afhankelijk van welk medicijn u gebruikt. Dat betekent dat als u stopt op het moment dat u al geïnfecteerd bent het medicijn nog een tijd het immuunsysteem beïnvloedt.

Daarom kunnen wij ons voorstellen dat u toch de afweging maakt om te willen stoppen met uw medicatie.

Indien u besluit om door te gaan met de medicatie dan houdt u de gebruikelijke controles op de polikliniek dermatologie (voorlopig telefonische consulten).

Indien u besluit om te stoppen met de medicatie dan verzoeken we u dat door te geven aan de secretaresse van de polikliniek dermatologie. Als uw huidziekte (fors) toeneemt na stoppen met de medicatie kunt u contact opnemen met de poli dermatologie.

**U heeft wel verschijnselen van een mogelijke Corona-infectie (koorts en/of hoesten en/of keelpijn en/of neusverkoudheid).**

In dit geval adviseren we u de immuunmedicatie direct te stoppen. Daarnaast adviseren we u om de richtlijnen van het RIVM te volgen (zie hieronder).

Als uw huidziekte (fors) toeneemt na stoppen met de medicatie kunt u contact opnemen met de poli dermatologie.

*Bovenstaande informatie kan wijzigen ten gevolge van nieuwe informatie of nieuwe inzichten.*

Adviezen van het RIVM bij infectie verschijnselen.

**Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?**

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts **niet** te bellen. Uw klachten zijn mild.

**Worden je klachten erger: u heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en u hoest of ademt moeilijk?**

Bel met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.