

## Allergietest

### Aanmelden

Bij binnenkomst in het Laurentius Ziekenhuis meldt u zich aan bij een van de aanmeldzuilen in de entreehal en controleert u uw gegevens. Vervolgens krijgt u een dagticket. Met dit ticket meldt u zich aan bij de zuil op de longfunctieafdeling (route 1.12). U kunt daarna plaatsnemen in de wachtruimte.

### Doel van het onderzoek

Onderzoeken of er een overgevoeligheid bestaat voor een bepaalde stof, allergenen genaamd.

### Vorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek stopt u tijdelijk bepaalde medicijnen. U hoort dit van uw arts en/of van de poli assistente en u kunt dit lezen in onderstaand overzicht.

Ook mag u op de dag van het onderzoek geen bodylotion of crème op uw onderarmen gebruiken.

Na het onderzoek kunt u uw medicijnen weer volgens voorschrift gebruiken.

### Tijdelijk stoppen van medicijnen

Medicijnen zijn vaak onder verschillende namen te verkrijgen. Het kan dus zijn dat een medicijn dat u gebruikt niet in onderstaand overzicht staat. Bij twijfel of u het medicijn tijdelijk moet stoppen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de poli longgeneeskunde, telefoon (0475) 38 26 42.

4 dagen voor het onderzoek stoppen	Werkzame stof staat tussen haakjes
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aerius (desloratadine)</li> <li>• Allegra (fexofenadine hydrochloride)</li> <li>• Allerfee (loratadine)</li> <li>• Atarax (Hydroxyzine dihydrochloride)</li> <li>• Cinnarizine (cinnarizine)</li> <li>• Claritine (loratadine)</li> <li>• Ebastine (ebastine)</li> <li>• Fenistil (dimetindeen)</li> <li>• Hormoonzalven</li> <li>• Hydroxine (hydroxine)</li> <li>• Kestine (ebastine)</li> <li>• Mizollem (mizolastine)</li> <li>• Mebhydroline (mehydroline)</li> <li>• Nedeltran (alimemazine)</li> <li>• Neusdruppels en neussprays</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phenergan (promethazine)</li> <li>• Polaramine (dexchlorfeniramine)</li> <li>• Primatour (cinnarizine en chloorcyclizine)</li> <li>• Promethazine (ipecacuanhatinctuur en sulfoguaiacolaatkaliuim)</li> <li>• Reactine (cetirizine)</li> <li>• Rupafin (rupatadine)</li> <li>• Semprex (acrivastine)</li> <li>• Sinequan (doxepine)</li> <li>• Tavegil (clemastine)</li> <li>• Telfast (fexofenadube)</li> <li>• Tinset (oxatomide)</li> <li>• Tridulan (terfenadine)</li> <li>• Xyzal (levocetirizine dichl.)</li> <li>• Zaditen (ketotifen)</li> <li>• Zyrtec (cetirizine)</li> </ul>

### Het onderzoek

Meestal worden ongeveer 15 verschillende teststoffen (allergenen genaamd) gebruikt bij een allergietest. Afhankelijk van de aanvragend arts kan dit aantal afwijken.

De longfunctie-analist markeert met een ballpoint of tape de plaatsen voor de prikjes op de onderarmen. Van elk allergeen wordt vervolgens een druppeltje aangebracht op een gemarkeerde plaats. Met een speciaal prikkertje wordt door de druppel in de huid geprikt. Hierdoor wordt het druppeltje in contact gebracht met het weefsel net onder de opperhuid. Dit prikje is vrijwel pijnloos. Na 15 minuten wachten kan worden aangetoond of er een overgevoeligheid bestaat.



*Het aanbrengen van de druppels op de onderarm*

### **Duur van het onderzoek**

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

### **Vragen**

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee vóór het onderzoek terecht bij uw behandelend arts of de longfunctie-analist.

### **Verhinderd**

Wilt u bij verhindering even contact opnemen met de Longfunctieafdeling? Wij zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (0475) 38 26 42.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis  
34289410 - Longfunctie - mei 2020