



Punctie onder echogeleide bij een afwijking in de borst en/of oksel

Als er een afwijking in uw borst en/of oksel zichtbaar is op de mammografie of bij de echografie, krijgt u verder onderzoek. Een punctie wordt dan gedaan om op geleide van echografie met een naald weefsel uit de borst en/of oksel weg te nemen.

Is de afwijking op de echo te zien, dan kan de punctie meteen worden gedaan. Is de afwijking alleen op de mammografie zichtbaar, dan krijgt u een nieuwe afspraak omdat het onderzoek meer tijd in beslag neemt.

Vorbereiding

Bloedverduunners

Gebruikt u bloedverduunners dan willen we dit graag weten. Ook is het belangrijk welk type bloedverduunners dit zijn. Met de arts overleggen we of de punctie door kan gaan zonder eerst te stoppen met de bloedverduunners.

Verder is er voor de punctie onder geleide van echografie geen voorbereiding noodzakelijk.

De punctie

Een borstpunctie of okselklierpunctie kan op twee verschillende manieren worden verricht:

- Cytologisch: Met een dunne naald wordt in de afwijking geprikt. Zo worden cellen opgezogen die door de afdeling Pathologie worden onderzocht.
- Histologisch: Nadat u een plaatselijke verdoving heeft gekregen, wordt met een dikkere naald wat weefsel weggenomen. Deze stukjes weefsel worden door de afdeling Pathologie nader onderzocht. De plaats waarin is geprikt, wordt door de laborante afgeplakt met een drukverbandje.

Duur en plaats

De punctie duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en vindt plaats op de afd. Medische Beeldvorming (route 0.13).

De uitslag

De uitslag van het weefsel onderzoek ontvangt u via de aanvragend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen kunt u deze stellen aan de laborante.

Verhinderd

Neemt u bij verhindering a.u.b. tijdig contact op met de afdeling Medische Beeldvorming.
Telefoonnummer (0475) 38 23 58 of 38 22 58.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl