



## Hydrocele

In overleg met uw behandelend uroloog heeft u afgesproken dat u binnenkort geopereerd wordt aan een hydrocèle. In deze folder informeren wij u over deze ingreep.

### Wat is een hydrocèle?

Een hydrocèle is een zwelling in het scrotum (balzak) ontstaan door ophoping van vocht rondom de testikel.

### Narcose

In overleg tussen u, de uroloog en de anesthesioloog wordt bepaald of de operatie onder algehele narcose (anesthesie) of regionale (gedeeltelijke) narcose plaatsvindt.

### Vorbereiding

Van de afdeling Opname krijgt u bericht wanneer de operatie zal plaatsvinden. U krijgt dan ook een oproep voor de preklinische screening. Dit houdt in dat u een voorbereidend gesprek krijgt met een verpleegkundige over de geplande opname, de voorbereidingen op de opname en de nazorg. Hier kunt u ook met vragen terecht. Tevens krijgt u een gesprek met de anesthesioloog over de narcose.

Om wondinfecties na de operatie te voorkomen **mag** u in de week vóór de operatie **het operatiegebied niet ontharen**. Dit geldt ook voor ontharen vanuit cosmetisch oogpunt, zoals bijvoorbeeld het ontharen van benen, oksels en schaamstreek. Wanneer ontharen voor een operatie noodzakelijk is, gebeurt dit vlak voor de operatie in de operatiekamer.

### De dag van de operatie

Na aankomst op de afdeling zal een verpleegkundige u naar uw kamer brengen en krijgt u een antistollingsmiddel om bloedstolling (trombose) te voorkomen. Dit bestaat uit een injectie onder de huid. Tevens is er gelegenheid om vragen te stellen.

### De operatie

Vlak voor de operatie krijgt u een infuus ingebracht. Als u onder narcose bent, maakt de uroloog een snede in het scrotum (balzak). Daarna opent hij het vlies waarin het vocht is opgehoopt en verwijdert dit vocht. Het vlies wordt vervolgens zo omgeklapt dat er geen vocht meer kan ontstaan. Een enkele keer is een wonddrain voor 24 uur nodig. Een wonddrain is een slangetje, dat wordt ingebracht in het wondgebied en dat zorgt voor de afvoer van wondvocht.

Meestal krijgt u na de operatie een suspensoir. Dit is een soort strak broekje om uw balzak zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit zorgt voor een zo klein mogelijke kans op een nabloeding en/of bloeduitstorting. Het broekje dient meestal 48 uur te blijven zitten. Daarna kunt u het verwijderen.

### Na de operatie

Als u terug bent op de afdeling blijft het infuus nog even zitten, totdat u goed kunt drinken/eten en heeft geplast. Wanneer het infuus er uit is, is het van belang om minimaal 2 liter per dag te drinken. De verpleegkundige komt regelmatig bij u en zal uw bloeddruk meten. Heeft u een wonddrain dan bepaalt de uroloog wanneer deze er uit mag. Meestal is dit na 1 tot 2 dagen na de operatie. Uw verblijf in Laurentius is in de meeste gevallen 1 dag zodat u 's avonds weer naar huis kunt.

## **Nazorg**

Wondjes worden zoveel mogelijk gehecht met oplosbare hechtingen. Deze verdwijnen vanzelf. 'Gewone' hechtingen worden meestal na een week op de polikliniek verwijderd. De verpleegkundige maakt voor u een afspraak voor controle.

## **Adviezen voor thuis**

De dag na de operatie begint u met dagelijks te douchen; na 1 week kunt u ook weer in bad. We adviseren u om de eerste week niet te sporten en geen zware lichamelijke arbeid te verrichten. Om het scrotum te ondersteunen is het aan te raden enige tijd een strakke onderbroek te dragen.

## **Complicaties**

Slechts zelden ontstaat er een nabloeding of ontsteking in de wond. Aanvankelijk zwelt de balzak nog wat op maar na enkele weken is dit verdwenen en is het scrotum veel slanker dan voor die tijd omdat het vocht nu verdwenen is.

## **Vragen**

Heeft u nog vragen, stel deze dan aan uw uroloog of aan de verpleegkundige op de afdeling waar u wordt opgenomen.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie.

De polikliniek is te bereiken op (0475) 38 22 41.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis  
34278540 - Urologie - mei 2020