



Urolon-injecties met plaatselijke verdoving

Behandeling van stress-incontinentie

Samen met uw uroloog heeft u besloten voor behandeling van stressincontinentie met Urolon-injecties met plaatselijke verdoving. Hiervoor wordt u in dagbehandeling opgenomen.

Stressincontinentie of inspanningsincontinentie is urineverlies door drukverhogingen, bijvoorbeeld bij springen, hoesten, sporten, snel opstaan of tillen.

Urolon® is een product dat onder de blaasuitgang op 3 plaatsen in de wand van de plasbuis wordt geïnjecteerd, waardoor de plasbuis beter afsluiten. Bovendien stimuleert het nieuwe collageenvorming (aanmaak van bindweefsel) en versterkt het de plasbuiswand.

Urolon is een steriele, geleachtige vulstof, latex vrij, niet koortsverwekkend, biologisch afbreekbaar en dus een niet blijvend implantaat.

Vorbereiding

U wordt voor dagbehandeling opgeroepen via het Opnamebureau.

Voorafgaand aan de behandeling neemt u een antibioticum. Het recept heeft u van uw uroloog gekregen.

Wij adviseren u gemakkelijke kleding te dragen.

Behandeling

Voor het onderzoek vragen wij u het onderlichaam van kleding te ontdoen. Vervolgens mag u in rugligging met de benen gespreid op de onderzoektafel plaatsnemen. U krijgt 40 ml lidocaïne (verdoving) toegediend via een katheter in de blaas. De uroloog dient vervolgens nog 2 tot 3 extra plaatselijke verdovingen toe, net langs de plasbuis. De ervaring is dat deze prikjes goed te verdragen zijn.

Na ongeveer 10 tot 30 minuten is deze verdoving ingewerkt. De uroloog brengt de cystoscoop in en plaatst de Urolon®-vulstof in de plasbuis. Tijdens het onderzoek laat de uroloog een steriele spoelvoeistof in uw blaas lopen om goed zicht te hebben. Tijdens het vullen kunt u aandrang voelen om te plassen. Indien de druk in de blaas te groot wordt, kunt u dit aangeven.

Na de behandeling gaat u nog even naar de afdeling dagbehandeling. Het is van belang dat u voldoende drinkt. Als u uw blaas goed leeg plast, mag u met ontslag.

Leefregels gedurende 1 tot 2 weken na de behandeling

- 1,5 liter drinken per dag, bij voorkeur water,
- niet zwaar tillen (niet meer dan 5 kg),
- geen zware inspanning of intensief sporten,
- niet in bad,
- geen sauna, thermaal baden of zwemmen,
- zorg voor soepele stoelgang,
- geen seks met vaginale penetratie gedurende 1 maand,
- niet fietsen.

Complicatie

De kans op complicaties is klein. Soms treedt na de behandeling een blaasontsteking op. Deze wordt dan behandeld met antibiotica.

Controle

U krijgt een afspraak voor controle bij de uroloog 2-4 weken na de behandeling voor een controle echo van de blaas na plasmaming (flowmeting).

Effect

Bij de meerderheid van de patiënten is de ernst van de incontinentie na een jaar nog aanzienlijk verminderd. Is na verloop van tijd het effect van de behandeling verdwenen en komen de incontinentieklachten terug, dan kan de uroloog u opnieuw met Urolon behandelen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. De poli urologie is bereikbaar via telefoonnummer (0475) 382241.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34290230 - Urologie - oktober 2020