



Port-a-Cath®

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat er binnenkort een Port-a-Cath® bij u geplaatst gaat worden. Deze folder is bedoeld om u verder te informeren over de Port-a-Cath® en de procedure.



Port-A-Cath® veneus systeem



Wat is een Port-a-Cath®?

Een port-a-Cath® is een volledig implanteerbaar toedieningssysteem. Dit betekent dat het systeem in zijn geheel onder de huid wordt geplaatst; meestal op een geschikte, maar onopvallende plaats op de borst.

Een Port-a-Cath® systeem bestaat uit twee onderdelen:

1. Het reservoir: een kleine metalen injectiekamer die afgesloten is met een zelfsluitend siliconen membraan.
2. De katheter: een dun flexibel slangetje dat in een grote ader wordt ingebracht.

Als de Port-a-Cath® bij u geplaatst is, ziet u dat aan de buitenkant niet. U heeft echter wel twee kleine littekens op uw borst: één litteken waar het reservoir is geplaatst en één litteken waar de katheter is ingebracht. Ook kunt u het reservoir onderhuids voelen.

Vorbereiding

Voordat de Port-a-Cath® wordt geplaatst, krijgt u een afspraak bij de chirurg voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u van de chirurg uitleg over de Port-a-Cath® en de procedure.

Het plaatsen van de Port-a-Cath® vindt plaats op de operatiekamer. U hoeft hiervoor niet onder narcose en hoeft ook niet nuchter te zijn.

Als u bloedverdünners gebruikt, bespreekt de arts vooraf met u of u deze moet stoppen, hoelang en wanneer u weer mag starten.

De ingreep duurt ongeveer 30-60 minuten. Na de ingreep kunt u direct naar huis. Het is aan te raden niet zelf naar huis te rijden.

Inbrengen van de Port-a-Cath®

Het inbrengen van een Port-a-Cath® is een kleine chirurgische ingreep. U krijgt een plaatselijke verdoving met behulp van een of meerdere verdovingsprikken rond het te behandelen gebied. Deze verdoving kan zo'n half tot twee uur aanhouden. De chirurg maakt twee kleine sneetjes. Via het ene sneetje wordt de katheter in het bloedvat gebracht. Via het andere sneetje wordt het reservoir zelf onder

de huid geplaatst. De wondjes bij de inbreng- en insteekplaats worden gecontroleerd. Na verloop van tijd blijven er twee kleine littekens en een bobbel onder de huid zichtbaar.

Er wordt een röntgenfoto gemaakt direct na de ingreep om te kijken of de Port-a-Cath® op de goede plaats zit en er geen complicaties zijn opgetreden. Indien de Port-a-Cath® goed ligt, kan het reservoir meteen aangeprikt worden.

Verzorging

Na het plaatsen van de Port-a-Cath® heeft u twee wondjes.

Vaak zijn de wondjes onderhuids gehecht en lossen de hechtingen vanzelf op. De wondjes kunnen nog een beetje nabloeden. Dit is normaal. Na het inbrengen kan er wat spierpijn en een stijf gevoel ontstaan in de schouder, aan de kant waar de Port-a-Cath® is ingebracht. U kunt hiervoor een pijnstiller krijgen. Er kan een blauwe plek ontstaan. Die verdwijnt na verloop van tijd.

Na de ingreep mag de pleister na 24 uur verwijderd worden. Plak de wond opnieuw af, zeker als u gaat douchen. U mag de eerste drie dagen niet in bad.

Vermijd de eerste twee weken lichamelijke arbeid. Indien de Port-a-Cath® niet wordt gebruikt, moet er iedere 6 weken een heparine oplossing ingespoten worden. Dit om te voorkomen dat het systeem verstopt raakt met bloed dat kan gaan stollen in het systeem.

Complicaties

Het is belangrijk om regelmatig de aanprikkplaats te onderzoeken. Neem contact op met het ziekenhuis bij de volgende klachten:

- Als er tekenen van infectie zijn:
 - De huid waaronder het reservoir ligt is rood, warm, pijnlijk gezwollen en/of er komt pus uit.
 - Als u koorts ($\geq 38.5^{\circ}\text{C}$) en/of koude rillingen krijgt.
- Als er pijn en/of zwelling optreedt van het gebied rondom de aanprikkplaats, bijvoorbeeld de arm of het halsgebied.
- Als u denkt dat het Port-a-Cath® systeem verschoven is.

Goed om te weten

U zult nauwelijks hinder hebben van de Port-a-cath®. Als de wondjes genezen zijn, zijn er geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig en kunt u alles doen. U kunt met de Port-a-Cath® zwemmen, baden en douchen. U kunt met de Port-a-Cath® door het beveiligingspoortje in de winkel en luchthaven gaan. Ondanks het feit dat de Port-a-Cath® van metaal gemaakt is, kunt u zonder probleem een MRI of CT-scan laten maken.

Het dragen van een driepuntsgordel kan soms pijnlijk zijn door de plaats van de Port-a-Cath®. U kunt eventueel een ontheffing voor het dragen van de autogordel aanvragen. Dit kan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), afdeling vorderingen: www.cbr.nl of telefoon 0900-0210.

De katheter mag blijven zitten totdat de behandeling is afgelopen. Dit kan zelfs enkel jaren zijn. Het is misschien handig om een implantatiebewijs bij u te dragen. U kunt het implantatiebewijs downloaden op de website www.bbraun.nl.

Contact

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:

- Consulterend oncologieverpleegkundigen (tijdens kantooruren): (0475) 38 2839
- Spoedeisende Hulp bij spoedeisende problemen (buiten kantooruren): (0475) 382254

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34278140 - Interne geneeskunde oncologie - augustus 2021