



Drainage van een cyste in de borst

Als er een afwijking in uw borst en/of oksel zichtbaar is op de mammografie of bij de echografie, krijgt u verder onderzoek. Is de afwijking een cyste (een holte gevuld met vocht), dan kan deze meteen worden leeg geprikt.

Vorbereiding

Een voorbereiding voor dit onderzoek is niet nodig.
Het gebruik van bloedverdunners hoeft u niet te stoppen.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij binnenkomst in het ziekenhuis aan bij een van de aanmeldzuilen. U volgt de route naar de Medische Beeldvorming (route 0.13). Scan uw ticket bij de zuil en neem vervolgens plaats in de wachtruimte.

De punctie

Het onderzoek gaat als volgt. Op de huid van de borst of oksel wordt een geleachtige vloeistof aangebracht. Dan wordt er met een apparaatje dat geluidsgolven uitzendt en deze vervolgens weer opvangt (echo), over de huid gestreken.

De geluidsgolven worden omgezet in beelden en zichtbaar gemaakt op een monitor. Ook worden van deze beelden digitale foto's gemaakt. Met behulp van een dunne naald wordt onder geleide van de echobeelden in de cyste geprikt, zodat het vocht uit de holte kan worden weggezogen.

Meestal hoeft dit vocht niet nader onderzocht te worden.

Duur en plaats

De punctie duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming (route 0.13).

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen kunt u deze stellen aan de laborante.

Verhinderd

Neemt u bij verhindering alstublieft tijdig contact op met de afdeling Medische Beeldvorming, tel. (0475) 38 2358 of 38 2258.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl