



Ascitesdrainage of drainwissel onder echogeleide

Echografie

Bij een echografie worden organen zichtbaar gemaakt met behulp van geluidsgolven. Tijdens het onderzoek wordt een drain geplaatst om vocht af te voeren.

Vorbereiding

De dag voor en de dag van het onderzoek mogen alle medicamenten ingenomen worden tot 2 uur voor het onderzoek.

Heeft u bloedverdunnende medicijnen, vraag uw arts of u deze tijdelijk moet stoppen.

Aanmelden

Wilt u zich alstublieft 15 minuten vóór de afspraaktijd aanmelden bij een van de aanmeldzuilen bij de hoofdingang?

Het onderzoek

Op de huid wordt een gel aangebracht. Dan wordt er met een apparaatje, dat geluidsgolven uitzendt en deze weer opvangt, over de huid gestreken. De geluidsgolven worden omgezet in beelden en deze worden zichtbaar op een monitor. Van de beelden worden digitale foto's gemaakt.

Na het zetten van een verdovingsprik prikt de radioloog of specialist met een drain (buisje) in de buik en laat deze drain op de juiste plaats achter om zo het overtollige vocht uit het lichaam af te voeren.

Soms wordt een gedeelte van het vocht gebruikt voor verder onderzoek. In dat geval krijgt u de uitslag van uw behandelend arts.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, stelt u ze dan gerust.

Medische Beeldvorming, tel. (0475) 382258.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl