



## **HSG**

### **Hystero Salpingo Grafie**

In overleg met uw behandelend arts krijgt u op korte termijn een röntgencontrastonderzoek van de baarmoederholte en de eileiders: een Hystero Salpingo Grafie (HSG). Er wordt daarbij speciaal gekeken of de beide eileiders open zijn. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Indien het onderzoek vanwege een kinderwens verricht gaat worden, dan zal dit altijd plaatsvinden ná de menstruatie en vóór een nieuwe eisprong.

U belt aan het begin van de nieuwe cyclus naar de poli gynaecologie - tel. (0475) 382648 - om de afspraak vast te leggen. Bij twijfel over een eventuele zwangerschap wordt vooraf een zwangerschapstest uitgevoerd.

#### **Voor het onderzoek**

De fertiliteitsarts zal, voordat de HSG plaatsvindt onderzoek doen om te kijken of het nodig is om antibiotica voor te schrijven.

Indien u een recept krijgt hiervoor, neemt u beide antibiotica-tabletten in, de avond vóór het onderzoek.

De kans op een infectie ten gevolge van het onderzoek is dan vrijwel uitgesloten.

Eén tot twee uur vóór het onderzoek neemt u de voorgeschreven pijnstiller in.

#### **Het onderzoek**

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de afdeling radiologie. De fertiliteitsarts of gynaecoloog zal het onderzoek uitvoeren.

U wordt gevraagd uw onderkleding uit te doen en plaats te nemen op de onderzoekstafel in gynaecologische houding met de benen in de steunen. Een radiologisch laborant assisteert bij het onderzoek. De arts plaatst het speculum (de 'eendenbek') en ontsmet de baarmoedermond met een jodiumoplossing. Vervolgens schuift zij/hij een dun slangetje op tot in de baarmoederholte. Via dit slangetje wordt de contrastvloeistof ingespoten. Tijdens het inspuiten van de vloeistof, dat meestal minder dan 1 minuut duurt, kunt u een krampend gevoel hebben. De baarmoederholte en eileiders worden in beeld gebracht en de verspreiding van het contrast in de buikholte wordt bekeken. De radioloog bekijkt en beoordeelt de beelden en maakt enkele röntgenopnames. Het hele onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De bevindingen worden in de regel direct na het onderzoek kort met u besproken. Bij het volgend polikliniekbezoek bespreekt de arts het vervolgtraject met u.

Na het onderzoek kunt u nog wat buikpijn hebben. U mag dan eventueel nog een pijnstiller nemen.

Ook geringe afscheiding of gering bloedverlies is mogelijk.

We adviseren u iemand mee te nemen, die u weer naar huis kan begeleiden.

De kans op complicaties bij een HSG-onderzoek is heel klein. Mocht echter de buikpijn aanhouden, toenemen of mocht u koorts krijgen (boven 38 °C) ondanks de antibiotica, dan neemt u contact op met:

- het secretariaat gynaecologie, tel. (0475) 382648 of
- in het weekend of 's nachts met het Moeder & Kind Centrum, tel. (0475) 382345.

## **Belangrijk**

Indien u een allergie heeft voor jodium, jodiumhoudend contrastvloeistof of antibiotica, meld dit altijd vóóraf. Er wordt dan rekening mee gehouden.

## **Nog vragen?**

Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. Op werkdagen kunt u tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met het secretariaat gynaecologie, tel. (0475) 38 26 48.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis  
34277000 - Gynaecologie - november 2022