



Behandeling met imiquimod creme

U heeft gekozen voor behandeling van uw CIN 2 of CIN 3 met imiquimod crème. In deze folder vindt u informatie over het behandelingschema, wat te doen bij bijwerkingen en de vervolgspraken.

Behandeling

De behandeling duurt 16 weken. U gebruikt de imiquimod tweemaal tot driemaal per week. De imiquimod moet vaginaal worden ingebracht, met een applicator (spuitje). Deze dient u zelf te vullen met de imiquimod crème. U gebruikt steeds een half zakje: vul eerst de applicator met het gehele zakje, waarna u de applicator voor de helft leegspuit en weggooit.

De andere helft brengt u vaginaal in. Doe dit 's avonds voor het slapengaan. U mag daarna geen geslachtsgemeenschap meer hebben.

's Ochtends spoelt u de restjes crème onder de douche weg.

Wij adviseren u om de dag na het inbrengen van de crème een tampon te gebruiken (wisselen a 4-6 uur). Hiermee voorkomt u irritatie van de schaamlippen door eventuele afscheiding van de crème.

Behandelingschema en vervolgspraken

Het behandelingschema is als volgt:

- U gebruikt de komende 16 weken 2 tot 3 keer per week imiquimod.
- Na de eerste week heeft u telefonisch een afspraak om te bespreken hoe het gaat.
- Stop imiquimod na 16 weken behandeling en 2 weken geen imiquimod.
- Indien u wordt behandeld voor CIN3 volgt een colposcopie met biopten.
 - Indien de afwijking nog aanwezig is, volgt een behandeling met liexcisie (LLETZ) van de baarmoedermond. Een liexcisie betekent dat we een laagje van de baarmoedermond waar onrustige cellen zitten weghalen. Voor meer info zie: <https://www.degynaecoloog.nl/informatiefilms/afwijkend-uitstrijkje-en-kolposcopie/>
 - Indien de afwijking verminderd of verdwenen is, is de behandeling klaar. U krijgt dan een controle uitstrijkje na 6 maanden

Hieronder vindt u een overzicht van het behandelingschema en de vervolgspraken tijdens de behandeling met imiquimod.

	Imiquimod-behandeling
Week 0	Start behandeling met imiquimod-crème
Week 1	Telefonische afspraak: bespreken van eventuele bijwerkingen
Week 16	Stop imiquimod
Week 18	Colposcopie met biopten indien u wordt behandeld voor CIN 3
Week 19	Telefonische afspraak, uitslag van de biopten: <ul style="list-style-type: none">◦ afwijking verminderd of verdwenen: einde behandeling◦ afwijking nog aanwezig: behandeling met liexcisie
Maand 6	Uitstrijkje

Welke bijwerkingen kunt u verwachten

In eerdere onderzoeken met imiquimod crème werden weinig ernstige bijwerkingen beschreven. De meest voorkomende bijwerking was vaginale afscheiding tijdens de behandeling en soms ook wat pijn of

jeuk in de vagina. Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn spierpijn en spierstijfheid, vermoeidheid, hoofdpijn en een koortsig gevoel.

Wat te doen bij bijwerkingen

Krijgt u klachten van spierpijn en spierstijfheid, vermoeidheid, hoofdpijn en/of een koortsig gevoel, volg dan het volgende schema:

Gebruik pijnstillers op de dagen dat u de klachten heeft.

1. Start met 4 keer per dag paracetamol 1000 milligram (twee tabletten).
2. Zo nodig kunt u ook drie keer per dag ibuprofen 400 milligram nemen.

Als dat onvoldoende helpt, neem dan contact op met onze polikliniek. Zij zullen u adviseren om de dosering van de imiquimod te verlagen of tijdelijk te stoppen.

Belangrijk om te weten

- U mag tijdens de behandeling met imiquimod **niet** zwanger worden. U moet daarom anticonceptie gebruiken tijdens de behandelperiode. Gebruikt u nog géén anticonceptie, dan kan uw gynaecoloog u adviseren over de mogelijkheden.
Imiquimod heeft invloed op de werking van een condoom. Het gebruik van enkel een condoom als anticonceptiemiddel wordt daarom niet geadviseerd.
Er is onvoldoende onderzoek beschikbaar naar de werking van de nuvaring bij vaginaal imiquimod gebruik. We ontraden in deze periode dan ook het gebruik van de nuvaring als anticonceptiemiddel.
- Het gebruik van imiquimod voor deze indicatie is een zogezegde 'off-label indicatie'. Dat betekent dat de fabrikant van het medicijn het niet hiervoor op de markt heeft gebracht. Dit betekent echter niet dat het voor deze indicatie niet geschikt is, aangezien dit middels wetenschappelijk onderzoek duidelijk aangetoond is.

Meer informatie?

Voor meer informatie, kijk op:

[Een afwijkend uitstrijkje, hoe verder? | De Gynaecoloog](#)

<https://www.degynaecoloog.nl/informatiefilms/afwijkend-uitstrijkje-vervolgonderzoek-behandeling/>

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem contact op met de polikliniek gynaecologie.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34291120 - Gynaecologie - december 2022