



Desensibilisatie

Aanmelden

Bij binnenkomst in het Laurentius Ziekenhuis meldt u zich aan bij een van de aanmeldzuilen in de entreehal en controleert u uw gegevens. Daarna krijgt u een dagticket. Met dit ticket meldt u zich aan bij de zuil op de longfunctieafdeling. U kunt daarna plaatsnemen in de wachtruimte.

Doel van het onderzoek

Desensibilisatietherapie of immunotherapie is bedoeld om de ernst en duur van de allergische klachten te verminderen. De behandeling bestaat uit een injectiekuur met een stof, die de klachten (allergie) veroorzaakt. Door een reactie van uw lichaam uit te lokken met de stof, die de allergie veroorzaakt, reageert uw lichaam minder snel en minder heftig op deze prikkels.

De kuur begint daarom in de periode voordat hooikoorts klachten beginnen.

Er zijn meer soorten kuren:

1. Een kuur met injecties met graspollen begint in januari of februari en eindigt in april voordat de grassen gaan bloeien. Een kuur met injecties met boompollen begint normaal in oktober of november en eindigt in januari voordat de eerste hazelaars gaan bloeien.
2. Een desensibilisatiekuur tegen o.a. huisstofmijt, bijen en wespen. Deze kuur wordt opgebouwd van 1x per week naar uiteindelijk 1x in de 4 weken een injectie. De kuur duurt ongeveer 5 jaar.

Vorbereiding

Op de dag van de injectie moet u zware inspanning (zoals sporten), zonnen, bezoek aan de zonnebank/sauna, hete douches vermijden.

Als u op de dag van de injectie allergische klachten of een infectie heeft, dient de injectie (in overleg met de longarts) te worden uitgesteld tot minimaal 1 week nadat de klachten zijn verdwenen.

Neem bij koorts (hoger dan 38,5°C) contact op met de longfunctieafdeling. 24 Uur na uw herstel wordt de injectie alsnog toegediend.

Wanneer u wordt gevaccineerd tegen virussen of bacteriën (bijvoorbeeld voor de griep of het coronavirus) of voor een buitenlandse reis, mag deze vaccinatie minimaal 7 dagen na de laatste injectie pas worden gezet. De desensibilisatiekuur kan 1 week na de vaccinatie weer worden voortgezet.

De behandeling

De longfunctie-analist neemt u mee naar een behandelkamer. De longfunctie-analist informeert u over het verloop van de kuur en geeft u de eerste injectie in de bovenarm.

Bij de tweede injectie vraagt de longfunctie-analist u hoe u de vorige injectie heeft verdragen en of er bijzonderheden zijn. Na de injectie gaat u naar de wachtkamer, waar u een half uur wacht. Gedurende deze tijd mag u niet zonder overleg de polikliniek verlaten. Als zich tijdens dit half uur geen bijzonderheden voordoen, mag u weer naar huis.

Nazorg

Na de injectie kan er vermoeidheid optreden. Daarom raden wij u aan voorzichtig te zijn bij besturing van een motorvoertuig en de bediening van machines.

Indien er een algemene of plaatselijke reactie (bovenarm) optreedt, meldt u dit bij uw volgend bezoek. Maak als het kan met uw telefoon een foto van de zwelling. Bij heftige reacties moet u direct uw huisarts of behandeld arts bellen.

Drink geen alcohol tot tenminste 12 uur na de injectie.

Duur van het onderzoek

De behandeling duurt ongeveer 35 minuten per injectie. De injectie zetten is in ongeveer 5 minuten gebeurd, vervolgens wacht u 30 minuten in de wachtkamer.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u daarmee vóór het onderzoek terecht bij uw behandelend arts of de longfunctie-analist.

Verhinderd

Wilt u bij verhindering even contact opnemen met de Longfunctieafdeling? Wij zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (0475) 38 26 42.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34289470 - Longfunctie - januari 2023