



## **Urolon-injecties met plaatselijke verdoving**

### **Behandeling van stress-incontinentie**

Samen met uw uroloog heeft u besloten voor behandeling van stressincontinentie met Urolon-injecties met plaatselijke verdoving.

Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek urologie.

Stressincontinentie of inspanningsincontinentie is urineverlies door drukverhogingen, bijvoorbeeld bij springen, hoesten, sporten, snel opstaan of tillen.

Urolon® is een product dat onder de blaasuitgang op 3 plaatsen in de wand van de plasbuis wordt geïnjecteerd, waardoor de plasbuis beter afsluiten. Bovendien stimuleert het nieuwe collageenvorming (aanmaak van bindweefsel) en versterkt het de plasbuiswand.

Urolon is een steriele, geleachtige vulstof, latex vrij, niet koortsverwekkend, biologisch afbreekbaar en dus een niet blijvend implantaat.

#### **Vorbereiding**

Soms is het nodig een antibioticum in te nemen als voorbereiding op de behandeling. Als dit nodig is, heeft u een recept van uw uroloog gekregen.

Wij adviseren u gemakkelijke kleding te dragen.

#### **Behandeling**

Voor het onderzoek vragen wij u het onderlichaam van kleding te ontdoen. Vervolgens mag u in rugligging met de benen gespreid op de onderzoektafel plaatsnemen. U krijgt 40 ml lidocaïne (verdoving) toegediend via een katheter in de blaas. De uroloog dient vervolgens nog 2 tot 3 extra plaatselijke verdovingen toe, net langs de plasbuis. De ervaring is dat deze prikjes goed te verdragen zijn.

Het duurt even voordat de verdoving werkt. De uroloog brengt de cystoscoop in en plaatst de Urolon®-vulstof in de plasbuis. Tijdens het onderzoek laat de uroloog een steriele spoelmoeistof in uw blaas lopen om goed zicht te hebben. Tijdens het vullen kunt u aandrang voelen om te plassen. Als de druk in de blaas te groot wordt, kunt u dit aangeven.

#### **Leefregels gedurende 1 tot 2 weken na de behandeling**

- 1,5 liter drinken per dag, bij voorkeur water,
- niet zwaar tillen (niet meer dan 5 kg),
- geen zware inspanning, intensief sporten of fietsen
- niet in bad,
- geen sauna, thermaal baden of zwemmen,
- zorg voor soepele stoelgang,
- geen seks met vaginale penetratie gedurende 1 maand, dit geldt ook voor het gebruik van tampons,
- ook mag u tot aan de controle geen paardrijden of andere activiteiten waarbij er veel druk op de plasbuis komt te staan.

#### **Complicatie**

De kans op complicaties is klein. Soms treedt na de behandeling een blaasontsteking op. Deze wordt dan behandeld met antibiotica.

## **Controle**

U krijgt een afspraak voor controle bij de uroloog 3 tot 4 weken na de behandeling voor een controle echo van de blaas na plasmaming (flowmeting).

## **Effect**

Bij de meerderheid van de patiënten is de ernst van de incontinentie na een jaar nog aanzienlijk verminderd. Is na verloop van tijd het effect van de behandeling verdwenen en komen de incontinentieklachten terug, dan kan de uroloog u opnieuw met Urolon behandelen.

## **Vragen?**

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. De poli urologie is bereikbaar via telefoonnummer (0475) 382241.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis  
34290230 - Urologie - januari 2023