

Drainage van een cyste in de borst

Als er een afwijking in uw borst en/of oksel zichtbaar is op de mammografie of bij de echografie, krijgt u verder onderzoek. Is de afwijking een cyste (een holte gevuld met vocht), dan kan deze meteen worden leeg geprikt.

Vorbereiding

Een voorbereiding voor dit onderzoek is niet nodig.
Het gebruik van bloedverdunners hoeft u niet te stoppen.

Aanmelden

De hoofdingang van het Laurentius Ziekenhuis bereikt u via de Oranjelaan. U meldt zich bij binnenkomst in het ziekenhuis aan bij een van de aanmeldzuilen. U volgt de route naar de Medische Beeldvorming. Scan uw ticket bij de zuil en neem daarna plaats in de wachtruimte. U wordt hier opgehaald, zodra u aan de beurt bent.

Wij verzoeken u zich in verband met de voorbereidingen
10 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn.

De punctie

Het onderzoek gaat als volgt. Op de huid van de borst of oksel wordt een geleachtige vloeistof aangebracht. Dan wordt er met een apparaatje dat geluidsgolven uitzendt en weer opvangt (echo), over de huid gestreken.

De geluidsgolven worden omgezet in beelden en zichtbaar gemaakt op een monitor. Ook worden van deze beelden digitale foto's gemaakt. Met een dunne naald wordt met hulp van de echobeelden in de cyste geprikt, zodat het vocht uit de holte kan worden weggezogen.

Meestal hoeft dit vocht niet nader onderzocht te worden.

Duur en plaats

De punctie duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen kunt u deze stellen aan de laborante.

Meer informatie over vervolg onderzoeken (echografie van de borst, echogeleide punctie, drainage van een cyste, stereotactische biopsie, mammapoli) vindt u op de website: www.lzr.nl/patientenfolders.

Verhinderd

Kunt u niet komen, neem dan alstublieft zo snel mogelijk contact op met de afdeling Medische Beeldvorming, tel. (0475) 38 2358 of 38 2258.