



## **Mesalazine MDL**

### **bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa**

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziektes voor kunnen doen.

Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen.

#### **Werking**

Mesalazine wordt gebruikt bij ontstekingen van de dikke darm. Mesalazine remt onder andere de vorming van stoffen die vrijkomen bij een ontsteking en vangt de stoffen die bij een ontsteking vrijkomen weg. Nadat Mesalazine is ingenomen komt het via de maag in de darm terecht. De werkzame stof komt vrij in de darm. De werking treedt geleidelijk in.

Mesalazine wordt niet alleen gebruikt om een ontsteking tot rust te brengen maar ook om nieuwe ontstekingen te voorkomen.

Mesalazine is bekend onder de volgende merknamen: Pentasa, Claversal, Dipentum, Asacol, Salofalk en Mezavant.

#### **Gebruik**

Mesalazine is verkrijgbaar in tabletten, als zetpil, als klysma en als granulaat. De arts bepaalt de dosering. Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het beste tijdens de maaltijd innemen. Slik de tabletten met water in hun geheel door. Granulaat kunt u met een lepel met vla, yoghurt of kwark innemen.

#### **Bijwerkingen**

Mesalazine heeft meestal weinig bijwerkingen. Heeft u echter last van bijwerkingen, raadpleeg dan altijd uw behandelend arts of mdl-verpleegkundige.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- huiduitslag, jeuk,
- misselijkheid,
- diarree,
- haaruitval,
- duizeligheid, hoofdpijn,
- stemmingsveranderingen,
- nierfunctiestoornissen (zelden).

Een nierfunctiestoornis geeft over het algemeen geen klachten. Daarom zal er één keer per jaar bloed worden geprikt om deze waarde te controleren.

## **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

Mesalazine is niet van invloed op de *vruchtbaarheid* van zowel man als vrouw.

Mesalazine kan tijdens de *zwangerschap* veilig worden gebruikt. Overleg wel altijd met uw arts als u een zwangerschapwens heeft of zwanger bent.

Mesalazine kan worden gebruikt tijdens de periode van *borstvoeding*. Bespreek ook dit met uw behandelend arts.

## **Tot slot**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met uw MDL-verpleegkundige.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis  
34290140 - Maag Darm en Leverziekten (MDL) - oktober 2023