

Punctie onder echogeleide bij een afwijking in de borst en/of oksel

Een punctie van een afwijking in de borst met echografie

Als er een afwijking in uw borst en/of oksel te zien is op de mammografie of bij de echografie, krijgt u verder onderzoek. Een punctie wordt dan gedaan om via echografie met een naald weefsel uit de borst en/of oksel weg te nemen.

Is de afwijking op de echo te zien, dan kan de punctie meteen worden gedaan. Is de afwijking alleen met een mammografie te zien, dan krijgt u een nieuwe afspraak omdat het onderzoek meer tijd in beslag neemt.

Vorbereiding

Bloedverduunners

Gebruikt u bloedverduunners dan willen we dit graag weten. Ook is het belangrijk welk type bloedverduunners dit zijn. Met de arts overleggen we of het nodig is tijdelijk de stoppen met bloedverduunners vóór de de punctie.

Verder is er voor de punctie via echografie geen voorbereiding nodig.

De punctie

Een borstpunctie of okselklierpunctie kan op 2 manieren worden verricht:

- Cytologisch: Met een dunne naald wordt in de afwijking geprikt. Zo worden cellen opgezogen die door de afdeling Pathologie worden onderzocht.
- Histologisch: Nadat u een plaatselijke verdoving heeft gekregen, wordt met een dikkere naald wat weefsel weggenomen. Deze stukjes weefsel worden door de afdeling Pathologie verder onderzocht. De plek waar geprikt is, wordt door de laborante verzorgd met een drukverbandje.

Duur en plaats

De punctie duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

De uitslag

De uitslag van het weefsel onderzoek ontvangt u van de aanvragend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen kunt u deze stellen aan de laborante.

Verhinderd

Neemt u bij verhindering alstublieft tijdig contact op met de afdeling Medische Beeldvorming. Telefoon (0475) 38 23 58 of 38 22 58.