



Cystoscopie met coagulatie

In overleg met uw behandelend uroloog is besloten dat u binnenkort een cystoscopie (blaasinkijk) met coagulatie krijgt onder plaatselijke verdoving. Hiermee worden blaaspoliepen / blaastumoren verwijderd. Deze ingreep vindt plaats op de polikliniek urologie. In deze folder leest u wat deze ingreep inhoudt.

Wat is een blaaspoliep / blaastumor ?

Het woord blaastumor is een verzamelnaam voor uitstulpingen en weefselgroei van het blaaslijmvlies. Er zijn verschillende soorten blaastumoren. Het is noodzakelijk om een blaastumor te verwijderen. De tumor kan groeien, bloedingen veroorzaken en ingroeien in de spierwand.

Als u bloedverdunners gebruikt, zal de uroloog van tevoren met u bespreken of u deze tijdelijk moet stoppen of door kunt nemen.

Dag van de behandeling

U meldt zich kort voor de afgesproken tijd in de centrale hal aan bij een van de aanmeldzuilen en krijgt een dagticket. Met dit ticket meldt u zich aan bij de aanmeldzuil van de poli urologie.

Vorbereiding

Voor de ingreep wordt een dunne blaaskatheter ingebracht en wordt uw blaas leeg gemaakt. Daarna wordt een verdovende vloeistof via die katheter in die blaas gebracht. Deze vloeistof verdooft de binnenkant van de blaas. Hierna neemt u plaats in de wachtkamer of loopt even over de gang, zodat de verdoving de tijd krijgt om in te werken. Het is belangrijk dat u tijdens het wachten (15 tot 30 min) NIET gaat plassen. De verdoving werkt dan onvoldoende.

Behandeling

Op het tijdstip van de behandeling wordt u door een verpleegkundige de behandelkamer binnen geroepen:

- In het kleedhokje doet u uw broek/rok en onderbroek uit.
- U neemt plaats op de behandeltafel en legt uw benen in de beensteunen.
- U krijgt een pleister op het linker bovenbeen. Als u op uw linker bovenbeen een litteken heeft of in de buurt van het linker bovenbeen protheses of materialen van schroeven/platen heeft zitten, moet u dit vertellen aan de verpleegkundige. Dan plakken we de pleister op een andere plek.
- De omgeving van de plasbuisopening wordt met water schoongemaakt. Daarna wordt u toegedekt met steriele doeken.
- Er wordt verdovend glijmiddel in de plasbuis aangebracht. Het inbrengen van de cystoscoop gaat dan makkelijker en de kans op pijn is minimaal.
- De uroloog brengt voorzichtig het slangetje (de cystoscoop) via de plasbuis in de blaas. De blaas wordt gevuld met een vloeistof, zodat de blaaswand goed te zien is. Door de volle blaas kunt u het gevoel krijgen te moeten plassen.
- Daarna brengt de uroloog via de cystoscoop een dunne draad in de blaas waarmee hij het tumorweefsel aanstipt totdat het weefsel losgelaten heeft. Tijdens dit aanstippen hoort u een 'piep' en u zult voelen dat er iets in de blaaswand gebeurt. Dit aanstippen doet meestal geen pijn. Mocht dit wel zo zijn, geef dit dan aan.
- Als al het weefsel is verwijderd, mag u uitplassen en daarna mag u naar huis.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u nog een paar dagen een branderig gevoel hebben bij het plassen. Ook kunt u wat meer aandrang voelen om te plassen en kan er wat bloed en/of kleine stukjes weefsel in uw plas zitten. Dit kan geen kwaad en gaat na een paar dagen vanzelf over.

Het is belangrijk dat u na de behandeling veel drinkt. De blaas en de urinewegen worden dan goed schoongespoeld en de klachten van de behandeling zullen sneller weg zijn.

Wanneer moet u contact opnemen?

- Bij koorts boven de 38,5°C.
- Als u meer dagen bloed in de urine blijft houden, waarbij de urine donkerrood van kleur is.
- Als u behalve bloed ook flinke bloedstolsels met de urine uitplast.
- Als het plassen niet goed gaat en u het gevoel heeft dat de blaas niet leeg komt.
- Als u steeds pijn heeft.

Vragen

Heeft na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de poli urologie, telefoon (0475) 38 2241.

Laurentius Ziekenhuis
Mgr. Driessenstraat 6
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)
6043 CV Roermond
www.lzr.nl

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis
34293310 - Urologie - februari 2024