



## Port a Cath

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat er binnenkort een Port-a-Cath® bij u geplaatst gaat worden. In deze folder informeren wij u over de Port-a-Cath® en de procedure.



Port-A-Cath® veneus systeem



### Wat is een Port-a-Cath®?

Een port-a-Cath® is een volledig implanteerbaar toedieningssysteem. Dit betekent dat het systeem in zijn geheel onder de huid wordt geplaatst. Meestal op een onopvallende plaats op de borst.

Een Port-a-Cath® systeem bestaat uit 2 delen:

1. Het reservoir: een kleine metalen injectiekamer die afgesloten is met een zelfsluitend siliconen membraan.
2. De katheter: een dun flexibel slangetje dat in een grote ader wordt ingebracht.

Als de Port-a-Cath® bij u geplaatst is, ziet u dat aan de buitenkant niet. U heeft twee kleine littekens op uw borst: één litteken waar het reservoir is geplaatst en één litteken waar de katheter is ingebracht. Ook kunt u het reservoir onder de huid voelen.

### Vorbereiding

Voordat de Port-a-Cath® wordt geplaatst, krijgt u een afspraak bij de chirurg. Tijdens dit gesprek geeft de chirurg u uitleg over de Port-a-Cath® en de procedure.

Het plaatsen van de Port-a-Cath® vindt plaats op de operatiekamer. U hoeft hiervoor niet onder narcose en u hoeft ook niet nuchter te zijn.

Als u bloedverdunningsmiddelen gebruikt, bespreekt de arts vooraf met u of u deze moet stoppen, hoelang en wanneer u weer mag starten.

De ingreep duurt ongeveer 30 tot 60 minuten. Na de ingreep kunt u direct naar huis. Wij adviseren u niet zelf naar huis te rijden.

### Inbrengen van de Port-a-Cath®

Het inbrengen van een Port-a-Cath® is een kleine chirurgische ingreep. U krijgt een plaatselijke verdoving via een of meerdere verdovingsprikken rond de plek waar de Port-a-Cath® komt. Deze verdoving werkt een half tot 2 uur. De chirurg maakt twee kleine sneetjes. Via het ene sneetje wordt de katheter in het bloedvat gebracht. Via het andere sneetje wordt het reservoir zelf onder de huid geplaatst.

De wondjes bij de inbreng- en insteekplaats worden gecontroleerd. Na verloop van tijd blijven er twee kleine littekens en een bobbel onder de huid zichtbaar.

Er wordt een röntgenfoto gemaakt direct na de behandeling om te kijken of de Port-a-Cath® goed zit en er geen complicaties zijn. Als de Port-a-Cath® goed ligt, kan het reservoir meteen aangeprikt worden.

## Verzorging

Na het plaatsen van de Port-a-Cath® heeft u twee wondjes.

Vaak zijn de wondjes onderhuids gehecht en lossen de hechtingen vanzelf op. De wondjes kunnen nog een beetje nabloeden. Dit is normaal. Na het inbrengen kunt u wat spierpijn en een stijf gevoel hebben in de schouder aan de kant van de Port-a-Cath®. U kunt hiervoor een pijnstiller krijgen. Er kan een blauwe plek ontstaan. Deze verdwijnt na verloop van tijd.

Na 24 uur mag de pleister verwijderen. Plak de wond opnieuw af, zeker als u gaat douchen. U mag de eerste 3 dagen niet in bad.

Doe de eerste 2 weken geen lichamelijke werk. Als de Port-a-Cath® niet wordt gebruikt, moet u iedere 6 weken een zoutoplossing door het systeem spuiten. Zo voorkomt u dat het systeem verstopt raakt met bloed dat kan gaan stollen.

## Complicaties

Het is belangrijk om regelmatig de aanprikplaats te onderzoeken. Neem contact op met het ziekenhuis bij de volgende klachten:

- Als er tekens zijn van infectie:
  - De huid waaronder het reservoir ligt is rood, warm, pijnlijk gezwollen en/of er komt pus uit.
  - Als u koorts ( $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$ ) en/of koude rillingen krijgt.
- Als er pijn en/of zwelling is rondom de aanprikplaats, bijvoorbeeld de arm of het halsgebied.
- Als u denkt dat het Port-a-Cath® systeem verschoven is.

## Goed om te weten

U zult bijna geen last hebben van de Port-a-Cath®. Als de wondjes genezen zijn, is er geen speciale zorg nodig en kunt u alles doen. U kunt met de Port-a-Cath® zwemmen, in bad gaan en douchen. U kunt met de Port-a-Cath® door het beveiligingspoortje in de winkel en luchthaven gaan. Ook al is de Port-a-Cath® van metaal, u kunt zonder probleem een MRI of CT-scan laten maken.

Het dragen van een driepuntsgordel kan soms pijnlijk zijn door de plaats van de Port-a-Cath®. U kunt eventueel een ontheffing voor het dragen van de autogordel aanvragen. Dit kan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), afdeling vorderingen: [www.cbr.nl](http://www.cbr.nl) of telefoon 088 227 77 00.

De katheter mag blijven zitten totdat de behandeling is afgelopen. Dit kan zelfs een paar jaar zijn. Het is misschien handig om een implantatiebewijs bij u te hebben. U kunt het implantatiebewijs downloaden op de website [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl).

## Contact

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met:

- Consulterend oncologieverpleegkundigen (tijdens kantooruren): (0475) 38 3187.
- Spoedeisende Hulp bij spoedeisende problemen (buiten kantooruren): (0475) 382254.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
(hoofdingang bereikbaar via de Oranjelaan)  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius Ziekenhuis  
34278140 - Interne geneeskunde oncologie - maart 2024