



Medische beeldvorming

Een punctie van een afwijking in de borst met echografie

Als er een afwijking in de borst en/of oksel zichtbaar is op de mammografie of bij de echografie, moet dit meestal verder onderzocht worden. Dit wordt gedaan door op geleide van echografie met een naald weefsel uit de borst en/of oksel weg te nemen.

Als de afwijking op de echo te zien is, kan de punctie meteen gedaan worden. Is de afwijking alleen op de mammografie zichtbaar, dan is de punctieprocedure ingewikkelder en neemt deze meer tijd in beslag en zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Vorbereiding

Gebruik bloedverduunners

Gebruikt u bloedverduunners, dan willen we dit graag weten. Ook is het belangrijk welk type bloedverduunners dit zijn. Met de arts zal overlegd worden of de punctie zonder te stoppen met de bloedverduunners door kan gaan.

Verder is er voor de punctie onder geleide van echografie geen voorbereiding noodzakelijk.

De punctie

Een borst punctie of okselklierpunctie kan op twee verschillende manieren worden verricht:

- Cytologisch: met een dunne naald wordt in de afwijking geprikt. Zodoende worden cellen opgezogen die door de afdeling pathologie worden nagekeken.
- Histologisch: Nadat u een plaatselijke verdoving heeft gekregen wordt met een dikkere naald wat weefsel weggenomen. Deze stukjes weefsel worden door de afdeling pathologie nader onderzocht. De plaats waarin is geprikt, wordt door de laborante netjes verzorgd.

Duur en plaats

De punctie duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming (route 47).

De uitslag

De uitslag van het weefsel onderzoek ontvangt u via de aanvrager/behandelaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen kunt u deze stellen aan de laborante.

Verhinderd

Neemt u bij verhindering a.u.b. tijdig contact op met de afdeling Medische Beeldvorming
Tel. (0475) 38 2358 of (0475) 38 2258