



## Maagonderzoek

De oesophago-gastro-duodenoscopie is een onderzoek waarbij de binnenzijde van de slokdarm, maag en de twaalfvingerige darm wordt bekeken.

Het onderzoek vindt plaats in het Maag-Darm-Levercentrum. Vanuit de ingang kunt u bewegwijzering no. 56 volgen.

Tijdens het onderzoek wordt de binnenzijde van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekeken, eventuele bijzonderheden en afwijkingen kunnen middels dit onderzoek worden ontdekt.

### Vorbereiding onderzoek

U mag vanaf 24.00 uur, de avond vóór het onderzoek niet meer eten, drinken en geen medicijnen gebruiken.

COPD- en astmapatiënten mogen hun inhalatiemedicijnen **wel** innemen.

Vindt het onderzoek na 12.30 uur plaats, dan mag u nog een licht ontbijt gebruiken (beschuit en kopje thee) om 07.00 uur 's ochtends.

### Medicijnen

Neem uw actuele medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw apotheek) mee naar het ziekenhuis.

Tijdens het onderzoek worden soms stukjes weefsel (biopten) weggenomen of poliepen verwijderd. Indien u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Acenocoumarol (Sintrommitis) of Fenprocoumon (Marcoumar), meld dit dan altijd aan de specialist of huisarts die het onderzoek aanvraagt. Voorafgaand aan het maagonderzoek wordt dan een bloedonderzoek gedaan (de trombotest = INR). Ook Ascal, Acetylsalicylzuur (Aspirine/Sinaspril), Dipyridamol (Persantin), Clopidogrel (Plavix/Vatoud/Grepid/Iscover/Duoplavin), Prasugrel (Effient), Ticagrelor (Brilique), Dabigatran (Pradaxa), Rivaroxaban (Xarelto), Apixaban (Eliquise) en Edoxaban (Lixiana) zijn van invloed op de bloedstolling. Daarom is het belangrijk het gebruik van deze medicijnen ook door te geven aan de behandelend arts.

**Stop nooit op eigen initiatief, maar altijd op voorschrift van de behandelend (huis)arts.**

Heeft u een pacemaker, ICD of een kunstklep dan moet u dit van te voren melden bij de behandelend arts.

### Het maagonderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde (schouder) en wordt er medische CO<sub>2</sub> naar binnen geblazen om de lege maag beter zichtbaar te maken.

Indien nodig kan er met een speciaal tangetje een stukje weefsel (biopt) uit de maagwand worden genomen voor onderzoek. Dit is niet pijnlijk. Hierdoor kan het onderzoek wat langer duren.

Uw arts kan u vertellen of er tijdens dit onderzoek weefsel of celmateriaal wordt afgenomen, voor onderzoek op het laboratorium voor pathologie. Meer informatie over weefselonderzoek door de patholoog vindt u in de folder 'Pathologie'. Deze folder vindt u op onze website [www.lzr.nl](http://www.lzr.nl) - patiëntenfolders.

Verdere instructies over het onderzoek krijgt u ter plekke van de endoscopieverpleegkundige.

Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten.

## **De uitslag**

De arts, die het onderzoek verricht, vertelt u tijdens of direct na het onderzoek iets over de uitslag. Vaak moet echter eerst het resultaat van weefselonderzoek in het laboratorium worden afgewacht; dat duurt ongeveer een week. De uitslag wordt dan doorgegeven aan de huisarts of specialist bij wie u onder behandeling bent.

## **Nazorg**

Wanneer uw keel verdoofd is, mag u gedurende één uur na het onderzoek niet eten of drinken. Dit om te voorkomen dat u zich verslikt.

## **Het maagonderzoek met sedatie**

In sommige gevallen wordt door de aanvragend arts besloten om het onderzoek onder sedatie plaats te laten vinden. De arts heeft dan met u afgesproken dat u vlak voor het onderzoek een kalmeringsmiddel (Midazolam) krijgt. Hierdoor bent u tijdens en na het onderzoek suf en slaperig. U bent echter niet 'onder narcose'. Vaak kunt u zich niet goed herinneren wat na het onderzoek met u is besproken.

Voor een maagonderzoek met sedatie wordt u voor een halve dag opgenomen op de MDL-dagverpleging. Afhankelijk van het tijdstip van uw onderzoek kunt u tussen de middag of in de vroege avond het ziekenhuis verlaten.

Een medewerker van de vervoersdienst brengt u naar de endoscopiekamer. Een speciaal opgeleide endoscopieverpleegkundige zal u voor, tijdens en na het onderzoek begeleiden.

U krijgt een verdoving met een kalmeringsmiddel (Midazolam), via een infuusnaald in uw arm. Verder krijgt u een knijpertje op een van uw vingers, om tijdens het onderzoek uw hartslag en zuurstofgehalte te controleren en een band om uw arm om de bloeddruk te controleren.

Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de MDL-nabewaking om bij te komen van het onderzoek en het kalmerend medicijn.

U mag meestal na 1 uur weer gewoon eten en drinken. Als er geen bijzonderheden zijn, mag u tussen de middag of in het begin van de avond naar huis.

## **Vervoer naar huis**

U krijgt tijdens het onderzoek een kalmerend medicijn. Daarom mag u gedurende 12 uur na het onderzoek beslist niet autorijden, fietsen of wandelen. Kortom u mag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom dat iemand anders u naar huis rijdt.

## **Verhinderung**

Wilt u bij verhinderung contact opnemen met het Maag-Darm-Levercentrum? Wij zijn te bereiken op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0475) 38 27 68.

Laurentius Ziekenhuis  
Mgr. Driessenstraat 6  
6043 CV Roermond  
[www.lzr.nl](http://www.lzr.nl)

Patiëntencommunicatie Laurentius ziekenhuis  
14283510 - MDL - oktober 2017