

Meatusplastiek

Verruimen van een nauwe gehoorgang

Inleiding

Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie, de meatusplastiek. In deze folder vindt u informatie over de ingreep.

De meatus



In het midden van de oorschelp zit de gehoorgang die naar het trommelvlies leidt. De overgang van de oorschelp naar de gehoorgang wordt de meatus genoemd. Het deel van de gehoorgang dat zich het dichtst bij de oorschelp bevindt, is van kraakbeen. Het is soepel en beweeglijk. Verder in de diepte gaat het over in benige, 'harde' gehoorgang van ongeveer één centimeter. Hierna begint het trommelvlies.

Wanneer is een operatie nodig?

De reden voor een meatusplastiek is een te nauwe toegang tot de gehoorgang.

- Een te nauwe gehoorgang kan bijvoorbeeld aanleiding zijn tot steeds terugkerende ontstekingen van de gehoorgang zelf (otitis externa) of te veel oorsmeer, dat zorgt voor een verstopping van de gehoorgang.
- Een hoortoestel is soms niet goed te dragen wanneer de gehoorgang te nauw is.
- Bij mensen waarin het verleden een radicaalholte heeft plaatsgevonden (d.w.z. de aangedane achterwand van de gehoorgang is weggehaald zodat er één holte ontstaat), kan een te nauwe gehoorgang aanleiding zijn tot een chronisch ontstoken holte.

Om dit ongemak te voorkomen kan de toegang tot de gehoorgang, de meatus, worden verruimd. De KNO-arts zal deze ingreep in het algemeen uitvoeren onder lokale verdoving. Dit gebeurt meestal poliklinisch en duurt gemiddeld 20 minuten.

De ingreep

De KNO-arts maakt een huidsnede in de oorschelp ter hoogte van de gehoorgang. Hierna verwijdert hij/zij huid, bindweefsel en kraakbeen van de oorschelp. Vervolgens hecht de KNO-arts de huid op zo'n manier dat er uiteindelijk een ruimere toegang tot de gehoorgang ontstaat. Zie foto.



Uitwendige gehoorgang na correctie

Na de ingreep

Na de operatie wordt een gaasje met antibiotica zalf ingebracht. Dit wordt na 1 week verwijderd door uw arts. Mocht het gaasje er onverhoopt uitkomen dan is het belangrijk om er niet aan te trekken. Beter kan het uitstekende deel worden afgeknipt. Meestal worden er zelf-oplosbare hechtingen gebruikt.

De pijn na de ingreep is beperkt en kan worden behandeld met paracetamol.

Het is niet ongebruikelijk dat er direct na de operatie nog wat bloed uit het oor komt. Zorg ervoor dat er geen water in het oor komt. Dit doet u door tijdens douchen een bekertje op het oor te houden. Ga niet zwemmen, baden of in de sauna.

Complicaties

De kans op complicaties bij deze ingreep is beperkt. Er is een kleine kans op infecties. Als u koorts krijgt of het oor wordt pijnlijk, rood en dik, dient u contact op te nemen met:

- de poli-KNO, telefoon (0475) 38 25 67
- buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp (SEH), telefoon (0475) 38 23 54.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de KNO-polikliniek. Telefoon: (0475) 38 25 67.